

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 20-7-63 230583

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 40-00-74)
(CALVADOS, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MANCHE, MAYENNE, MORBIHAN, ORNE)
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 81, rue de Dinan - RENNES.
C. C. P. : RENNES 9.404-94

ABONNEMENT ANNUEL
15 F.

Supplément n° 2 au Bulletin n° 34

19 JUILLET 1963

POMMES DE TERRE

AVERTISSEMENT

MILDIOU -

Les traitements appliqués selon nos derniers avis atteignent maintenant leur limite d'efficacité. Les conditions climatiques restant assez favorables à la maladie, il convient de renouveler la protection des fanes.

Côtes-du-Nord, Morbihan, Mayenne (région de Chatillon S/Colmont) Calvados, dès réception de cet avis.

Finistère, Ille-et-Vilaine, les 23 - 24

Si le temps est beau à la date fixée pour les traitements, ces interventions pourront être reculées jusqu'aux premières menaces de pluies. Toutefois, il faut se méfier de la tendance orageuse actuelle qui provoque des précipitations locales difficilement prévisibles.

INFORMATION

DEFANAGE -

Les conseils de traitement ci-dessus concernent les parcelles ayant fait l'objet d'une lutte suivie et correcte, présentant seulement quelques taches de Mildiou.

Les cultures dont les fanes sont détruites dans des proportions supérieures à 10% ne doivent plus être traitées. Il est préférable dans ce cas de couper les fanes et de les éliminer du champ ou de les détruire chimiquement.

Lorsque le Mildiou est arrivé à ce stade de développement sur feuillage, ce serait une erreur de vouloir prolonger la période de végétation. En effet, des applications répétées de fongicide assureront un ralentissement de l'évolution de la maladie et un léger gain de poids; mais elles permettront aussi le maintien du champignon sur les fanes, d'où les pluies entraîneront, vers le sol, les germes qui contamineront les tubercules. Les pertes de récolte seront alors nettement supérieures au gain de poids obtenu.

Il convient également d'éviter de couvrir la récolte sur le champ avec des fanes malades, et d'arracher les tubercules avant maturité (peleux), des contaminations pouvant se produire dans ces conditions. La maladie se manifestera plusieurs jours après, lorsque la récolte sera engrangée ou déjà dans le circuit commercial, entraînant des triages supplémentaires, des litiges et des refus par les services de contrôle.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements agricoles

F. BARBOTIN & J. C. HENAFF.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux

J. DELOUSTAL.